

Convexité

Travaux dirigés #14

Exercice 1 — Montrer qu'une boule d'un espace vectoriel réel normé est convexe.

Exercice 2 — Montrer que pour tous $x, y > 1$, $\ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \sqrt{\ln(x)\ln(y)}$.
Caractériser le cas d'égalité.

Exercice 3 —

1. Préciser les valeurs du réel α pour lesquelles $x \mapsto x^\alpha$ est convexe ou concave.
2. En déduire que pour tous $x \geq 0$ et $\alpha > 0$, $x^{\alpha+1} \geq (\alpha+1)x - \alpha$.

Exercice 4 —

1. Montrer que $x \mapsto \ln(1 + e^x)$ est convexe sur \mathbb{R} .
2. Établir, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n$, l'égalité :

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (1 + x_k)\right)^{1/n}$$

3. En déduire que pour tous $(u_1, \dots, u_n), (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}_+^n$,

$$\left(\prod_{k=1}^n u_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^n v_k\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{k=1}^n (u_k + v_k)\right)^{1/n}$$

Exercice 5 — *Fonction log-convexe*

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs réelles strictement positives. f est dite log-convexe si $\ln(f)$ est convexe.

1. Montrer que si f est log-convexe, alors f est convexe.
2. Montrer que f est log-convexe si et seulement si $x \mapsto a^x f(x)$ est convexe pour tout réel $a > 0$.
3. Montrer que la somme de fonctions log-convexes est encore log-convexe.
4. Montrer que $\Gamma : x \rightarrow \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est log-convexe sur \mathbb{R}_+^* .

Exercice 6 — *Fonction mid-convexe*

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et vérifiant :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

Montrer la convexité de f à l'aide de la densité dans \mathbb{R} de $\left\{\frac{k}{2^n} \mid (k, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}\right\}$.


Exercice 7 — Soient deux réels distincts a et b , une fonction convexe $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que f est nulle sur $[a, b]$.

Exercice 8 — *Inégalité de Gibbs*

Soit φ la fonction définie sur \mathbb{R}_+ par $\varphi(0) = 0$ et, pour tout $x > 0$, $\varphi(x) = -x \ln(x)$. Soit E un ensemble fini de cardinal $d \geq 1$. Si $(p_i)_{i \in E}$ une distribution de probabilité sur E , son entropie est définie par :

$$H(p) = \sum_{i \in E} \varphi(p_i)$$

Montrer que $0 \leq H(p) \leq \ln(d)$ et caractériser le cas d'égalité.

 **Exercice 9** — *Inégalités de Hölder et de Minkowski*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose, pour tout réel $p > 1$ et pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

Soient $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ et $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. a) Montrer que pour tous réels positifs α et β , $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}$.
b) En déduire l'inégalité de Hölder : $\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q$.
On commencera par traiter le cas $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$.
2. a) Établir que $\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| \cdot |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| \cdot |x_k + y_k|^{p-1}$.
b) En déduire l'inégalité de Minkowski : $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$.
3. Montrer que pour tout $p \geq 1$, $\|\cdot\|_p$ est une norme sur \mathbb{K}^n .
4. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \|x\|_\infty$.

Exercice 10 — *Inégalité de Carleson*

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe dérivable, nulle en 0. Soient $\alpha > -1$ et $p > 1$.

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $f(px) \geq f(x) + (p-1)xf'(x)$.
2. Au moyen de l'inégalité de Hölder, montrer que sous réserve de convergence,

$$\int_0^\infty t^\alpha \exp\left(-\frac{f(t)}{t}\right) dt \leq p^{\frac{(\alpha+1)p}{p-1}} \int_0^\infty t^\alpha \exp(-f'(t)) dt$$

3. En déduire que $\int_0^\infty t^\alpha \exp\left(-\frac{f(t)}{t}\right) dt \leq e^{\alpha+1} \int_0^\infty \exp(-f'(t)) dt$.

Exercice 11 — *Inégalité de Jensen*

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues. On suppose ϕ convexe.

1. À l'aide de sommes de Riemann, établir l'inégalité de Jensen :

$$\phi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \phi(f(t)) dt \quad (*)$$

2. a) On suppose désormais ϕ de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} . Soit $c \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \phi(x) \geq \phi(c) + (x-c)\phi'(c)$$

- b) En choisissant convenablement c , retrouver l'inégalité (*).
- c) Établir l'inégalité plus générale :

$$\phi\left(\int_a^b f(t)g(t) dt\right) \leq \int_a^b \phi(f(t))g(t) dt$$

3. Appliquer l'inégalité de Jensen pour $\phi_1 : x \mapsto x^2$ puis $\phi_2 : x \mapsto \frac{1}{x}$ et retrouver ces résultats en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.