

# Compléments d'algèbre linéaire

Travaux dirigés #04

## Partie A – Matrices

**Exercice 1** — Soient  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$  et  $A = (a_{i,j})$  la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  définie par :

$$a_{i,j} = \begin{cases} \alpha & \text{si } i \neq j \\ \beta & \text{si } i = j \end{cases}$$

- Calculer  $A^m$  pour  $m \in \mathbb{N}$ .
- Trouver une condition nécessaire et suffisante sur  $(\alpha, \beta)$  pour que la matrice  $A$  soit inversible et donner alors son inverse.

**Exercice 2** — *Matrices de rang 1*

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  une matrice de rang 1.

- Montrer qu'il existe  $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  tels que  $M = U^t V$ .
- Calculer, pour tout  $p \in \mathbb{N}$ ,  $M^p$ .
- Montrer que  $I_n + M$  est inversible si, et seulement si,  $\text{Tr}(M) \neq -1$  et déterminer alors  $(I_n + M)^{-1}$ .

**Exercice 3** — *Matrices nilpotentes*

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , on dit que  $A$  est une matrice nilpotente s'il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $A^k = 0$ . Si une matrice  $A$  non nulle est nilpotente, on appelle indice de nilpotence de  $A$  l'entier  $p \in \mathbb{N}$  tel que  $A^{p-1} \neq 0$  et  $A^p = 0$ .

- Trouver une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  nilpotente d'indice  $n$ .
- Montrer qu'en général, la somme de deux matrices nilpotentes n'est pas nilpotente.
- Montrer que si  $A, B$  sont deux matrices nilpotentes qui commutent alors  $A + B$  et  $AB$  sont nilpotentes.
- On suppose que  $A$  est nilpotente d'indice  $n$ .

Montrer que  $\sum_{k=0}^{n-1} A^k$  est inversible et calculer son inverse.

**Exercice 4** — Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Dans cet exercice,  $I$  désigne la matrice identité d'ordre 3 et  $0_3$  la matrice nulle d'ordre 3. On se propose de calculer les puissances de  $A$  de plusieurs manières.

1. *Par diagonalisation*

$$\text{On pose } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Démontrer que  $P$  est inversible et donner son inverse.
- Calculer  $D = P^{-1}AP$ ,  $D^n$  puis  $A^n$ .
- Montrer que  $D$  est inversible et en déduire que  $A$  est inversible.  
En déduire alors l'expression de  $A^{-n}$  en fonction de  $n$ , où  $n$  est un entier naturel.

2. *Par la formule du binôme de Newton*

- Soit  $B = A - 2I$ . Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , calculer  $B^n$  en fonction de  $B$ .
- En utilisant la formule du binôme, calculer l'expression de  $A^n$  en fonction de  $n$ ,  $A$  et  $I$ .

3. *Par polynôme annulateur*

- Montrer que  $A^2 - 3A + 2I = 0_3$ .
- Démontrer par récurrence qu'il existe deux suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telles que, pour tout entier  $n$ ,

$$A^n = a_n A + b_n I$$

Donner les relations de récurrence vérifiées par  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et exprimer  $a_n$  et  $b_n$  en fonction de  $n$ .

En déduire l'expression de  $A^n$  en fonction de  $n$ ,  $A$  et  $I$ .

- Justifier que  $A$  est inversible et donner son inverse.

**Exercice 5** — Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles et lorsqu'elles le sont, calculer leur inverse. Déterminer leur rang.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

**Exercice 6** — On considère la matrice à coefficients réels suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculer  $A^n$  pour  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Exercice 7** — Matrices à diagonale dominante

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$  une matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|$$

Soit  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  tel que  $AX = 0$ . En raisonnant sur l'une des coordonnées de  $X$  de plus grand module, montrer par l'absurde que  $X = 0$ . Qu'en déduire ?

## ⚙️ Partie B – Espaces vectoriels

**Exercice 8** — On peut définir les sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{K}^n$  par la donnée :

- > d'équations cartésiennes :  $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z - t = 0, x + 2z = 0\}$
- > d'un paramétrage :  $B = \{(2a - b + 2c, 3a + 2b - c, -b + c, c) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3\}$
- > d'une famille génératrice :  $C = \text{Vect}((0, -1, 2, 1), (1, 2, 1, 0))$

Écrire chacun de ces ensembles sous les trois formes possibles.

**Exercice 9** — Soit  $(e_1, \dots, e_p)$  une famille libre d'un  $\mathbb{K}$ -e.v.  $E$ .

1. On pose  $u_i = e_1 + \dots + e_i$  pour tout entier  $i$  compris entre 1 et  $p$ .  
La famille  $(u_1, \dots, u_p)$  est-elle libre ?
2. Reprendre la question avec  $v_k = e_k - e_{k+1}$  si  $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$  et  $v_p = e_p$ .

**Exercice 10** — On considère les trois suites complexes définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 1; \quad v_n = j^n; \quad w_n = \bar{j}^n$$

Montrer que la famille  $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}, (w_n)_{n \in \mathbb{N}})$  est libre.

**Exercice 11** —

1. Montrer que la famille  $((X - \lambda)^n)_{n \in \mathbb{N}}$  où  $\lambda \in \mathbb{C}$  est une base de  $\mathbb{C}[X]$ .
2. Déterminer les coordonnées de  $P \in \mathbb{C}[X]$  dans cette base.

**Exercice 12** — Montrer que les familles suivantes sont libres dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  :

$$\mathcal{F} = (x \mapsto \cos(nx))_{n \in \mathbb{N}}; \quad \mathcal{G} = (x \mapsto \cos^n(x))_{n \in \mathbb{N}}; \quad \mathcal{H} = (x \mapsto e^{\alpha_n x})_{n \in \mathbb{N}}$$

où les  $\alpha_n$  sont des nombres complexes deux à deux distincts.

**Exercice 13** — Soit  $E = \mathcal{C}([-2, 2], \mathbb{R})$  et  $F = \{f \in E \mid \forall k \in \llbracket -2, 2 \rrbracket f(k) = 0\}$ .

1. Montrer que  $F$  est un espace vectoriel. Est-il de dimension finie ?
2. Montrer que l'ensemble des fonctions polynomiales définies sur  $[-2, 2]$  de degré au plus 4 est un supplémentaire de  $F$  dans  $E$ .

**Exercice 14** — Soient  $H_1$  et  $H_2$  deux hyperplans distincts de  $\mathbb{R}^n$  où  $n \geq 2$ .

1. Quelle est la dimension possible de  $H_1 + H_2$  ?
2. Montrer que  $\dim(H_1 \cap H_2) = n - 2$ .

**Exercice 15** — Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension finie et  $F$  un s.e.v. distinct de  $E$ .

1. Soit  $H$  est un hyperplan de  $E$  ne contenant pas  $F$ . En considérant  $F + H$ , montrer que  $\dim(F \cap H) = \dim(F) - 1$ .
2. Montrer que  $F$  peut s'écrire comme l'intersection d'un nombre fini d'hyperplans.
3. Quel est le nombre minimum d'hyperplans nécessaires ?

## ⚙️ Partie C – Applications linéaires

**Exercice 16** — Soit  $(e_1, e_2, e_3)$  une base de  $\mathbb{R}^3$  et un réel  $\lambda$ .  
Démontrer que la donnée de

$$f(e_1) = e_1 + e_2, \quad f(e_2) = e_1 - e_2 \quad \text{et} \quad f(e_3) = e_1 + \lambda e_3$$

permet de définir un endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .

Comment choisir  $\lambda$  pour que  $f$  soit injective ? surjective ?

**Exercice 17** — Soient  $E = \mathbb{R}^3$  et  $f$  l'application définie sur  $\mathbb{R}^3$  par :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (4x + y - z, 2x + 3y - z, 2x + y + z)$$

1. Montrer que  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  puis construire sa matrice représentative dans la base canonique.
2. Trouver deux réels distincts  $\lambda$  et  $\mu$  tels que  $f - \lambda \text{id}_E$  et  $f - \mu \text{id}_E$  ne soient pas des automorphismes.
3. Montrer que  $E = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(f - \mu \text{id}_E)$ .
4. Déterminer la matrice représentative de  $f$  dans une base adaptée à la somme directe précédente.

**Exercice 18** — On note  $E = \mathbb{R}^3$  muni de sa base canonique  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  et  $f$  un endomorphisme non nul de  $E$  tel que  $f^3 + f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

1. On suppose que  $f$  est injective.
  - a) Montrer que  $f^2 = -\text{id}_E$ .
  - b) En déduire que  $(e_1, f(e_1))$  est une famille libre.
  - c) Trouver alors une contradiction en considérant une base de la forme  $(e_1, f(e_1), u)$  et en conclure que  $\text{Ker}(f) \neq \{0_E\}$ .
2. Justifier alors que  $\dim(\text{Ker}(f)) \in \{1, 2\}$ .
3. Montrer que :  $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Ker}(f^2 + \text{id}_E)$ .
4. On pose  $F = \text{Ker}(f^2 + \text{id}_E)$  et on note  $u$  un vecteur non nul de  $F$ .
  - a) Montrer que  $f(u) \in F$  et que  $(u, f(u))$  est libre.
  - b) En déduire que  $\dim(\text{Ker}(f^2 + \text{id}_E)) = 2$  et  $\dim(\text{Ker}(f)) = 1$ .
  - c) On considère  $v$  un vecteur non nul de  $\text{Ker}(f)$ .  
Montrer que  $\mathcal{B}' = (v, u, f(u))$  est une base de  $E$ .
  - d) Donner la matrice représentative de  $f$  dans  $\mathcal{B}'$ .

**Exercice 19** — Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On considère l'application  $\phi$  définie sur  $\mathbb{R}_n[X]$  par  $\phi(P) = (X + 1)P(X) - XP(X + 1)$ .

1. L'application  $\phi$  définit-elle un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ ?
2. Déterminer le noyau de  $\phi$ .
3. L'application est-elle surjective?

**Exercice 20** — Soient  $E = \mathbb{C}[X]$  et  $\varphi$  et  $\psi$  les endomorphismes de  $E$  définis par :

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \quad \varphi(P) = XP \quad \text{et} \quad \psi(P) = P'$$

1. Déterminer le noyau et l'image de  $\varphi$  et de  $\psi$ .
2. Déterminer le noyau de  $\psi^n$  où  $n \in \mathbb{N}^*$  et l'image de  $\psi - \alpha \text{id}_E$  où  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ .

**Exercice 21** — *Polynômes de Newton*

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $\psi : \begin{cases} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto P(X + 1) - P(X) \end{cases}$

1. Montrer que  $\psi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ .
2. a) Exprimer le degré de  $\psi(P)$  pour  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ .  
b) En déduire  $\text{Im}(\psi)$  et  $\text{Ker}(\psi)$ .
3. Soit  $P \in \mathbb{R}[X]$  de degré  $n$ .  
Montrer que  $(P, \psi(P), \psi^2(P), \dots, \psi^n(P))$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
4. a) Soit  $Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ . Montrer qu'il existe un unique  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  vérifiant :

$$P(X + 1) - P(X) = Q(X) \quad \text{et} \quad P(0) = 0$$

- b) Déterminer un tel polynôme  $P$  pour  $Q = X(X + 1)(X + 2)$ .
- c) En déduire une expression simplifiée de  $\sum_{k=0}^n k(k + 1)(k + 2)$ .

**Exercice 22** — Pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , soit  $\varphi_A$  l'application définie sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \varphi_A(M) = AM$$

1. Montrer que  $\varphi_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$  et donner sa matrice dans la base canonique.
2. Déterminer le noyau, l'image et le rang de  $\varphi_A$ .

**Exercice 23** — Soit  $\xi$  l'application définie sur  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  par  $\xi(f) = g$  avec,

$$\forall x \in [0, 1], \quad g(x) = \int_0^1 f(x + t) dt$$

1. Montrer que  $\xi$  est un endomorphisme de  $E$ .
2. Déterminer le noyau de  $\xi$ . On pourra pour cela dériver  $g$  en justifiant.

**Exercice 24** — Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. et  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Montrer que  $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g \circ f)$  et  $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$ .
2. Montrer que  $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Ker } g \cap \text{Im } f$ .
3. On suppose que  $g \circ f = f \circ g$ . Montrer que  $\text{Ker } f$  et  $\text{Im } f$  sont stables par  $g$ .

**Exercice 25** — Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. et  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Montrer que :  $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker } f \iff \text{Ker } g \cap \text{Im } f = \{0_E\}$
2. Montrer que :  $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im } g \iff \text{Ker } g + \text{Im } f = E$

**Exercice 26** — Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Montrer que :  $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2 \iff \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0_E\}$
2. Montrer que :  $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff E = \text{Ker } f + \text{Im } f$
3. En déduire qu'en dimension finie,

$$\text{Ker } f = \text{Ker } f^2 \iff \text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff E = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$$

🚲 **Exercice 27** — *Factorisation*

Soient  $E, F$  et  $G$  trois  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

On considère deux applications  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(E, G)$ . Montrer que :

$$\exists h \in \mathcal{L}(F, G) \text{ tel que } g = h \circ f \text{ si, et seulement si, } \text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$$

On pourra pour cela introduire un supplémentaire de  $\text{Ker}(f)$  dans  $E$ .

🚲 **Exercice 28** — *Endomorphismes nilpotents*

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension  $n$ . On suppose que  $f \in \mathcal{L}(E)$  est nilpotente, d'ordre de nilpotence  $p$ , c'est-à-dire que :  $f^p = \tilde{0}$  et  $f^{p-1} \neq \tilde{0}$ .

1. Montrer qu'il existe  $x_0 \in E$  tel que  $\mathcal{F} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$  est libre.  
En déduire que  $p \leq n$ .
2. Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  obtenue en complétant la famille  $\mathcal{F}$ .  
Quelle est la forme de la matrice de  $f$  dans cette base ?
3. Que peut-on dire de la suite  $(\text{rg}(f^k))_{k \in \mathbb{N}}$  ?
4. On suppose que  $p = n$  et soit  $g \in \mathcal{L}(E)$  vérifiant  $f \circ g = g \circ f$ .  
Montrer que  $g \in \text{Vect}(\text{id}_E, f, \dots, f^{n-1})$ .

**Exercice 29** — Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Établir l'encadrement :

$$|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$$

2. Justifier également l'inégalité :  $\text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$ .

**Exercice 30** — Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et  $u, v \in \mathcal{L}(E)$ .

1. En considérant la restriction de  $u$  à  $\text{Im}(v)$ , démontrer que :

$$\text{rg}(v) = \text{rg}(u \circ v) + \dim(\text{Ker}(u) \cap \text{Im}(v))$$

2. En déduire que :  $\dim \text{Ker}(u \circ v) \leq \dim \text{Ker}(u) + \dim \text{Ker}(v)$ .

**Exercice 31** — Soit  $E$  un espace de dimension finie  $2p$  avec  $p \geq 1$  et  $\varphi \in \mathcal{L}(E)$ . Montrer qu'il y a équivalence entre les propriétés :

$$(i) \varphi^2 = 0 \text{ et } \text{rg}(\varphi) = p \quad (ii) \text{Im}(\varphi) = \text{Ker}(\varphi)$$

$$(iii) \exists A \in \text{GL}_p(\mathbb{K}) \text{ telle que } \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ soit la matrice de } \varphi \text{ dans une certaine base.}$$

🚲 **Exercice 32** — *Centres de  $\mathcal{L}(E)$  et de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. On suppose que  $f \in \mathcal{L}(E)$  et que pour tout  $u \in E$ ,  $(u, f(u))$  est liée.  
Montrer que  $f$  est une homothétie.
2. On suppose  $E$  de dimension finie. Déterminer l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec tous les autres.  
On travaillera, pour  $x \neq 0_E$  quelconque, avec un projecteur sur  $\text{Vect}(x)$ .
3. Retrouver ce résultat par un calcul matriciel.

**Exercice 33** — *Formes linéaires sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$*

1. Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . Montrer que si pour toute matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ,  $\text{Tr}(AM) = \text{Tr}(BM)$ , alors  $A = B$ .
2. En déduire que pour toute forme linéaire  $\varphi$  de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , il existe une unique matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  telle que :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \varphi(M) = \text{Tr}(AM)$$

### Partie D – Projecteurs et symétries vectoriels

**Exercice 34** — Soient  $f$  et  $g$  les endomorphismes de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associés aux matrices :

$$M = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 4 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Montrer que  $f$  est une projection vectorielle et  $g$  une symétrie vectorielle; déterminer leurs caractéristiques géométriques.

**Exercice 35** — On se place dans  $\mathbb{R}^3$  muni de la base canonique  $(e_1, e_2, e_3)$ . On considère le plan  $\mathcal{P}$  et la droite  $\mathcal{D}$  d'équations respectives :

$$\mathcal{P}: x + y + z = 0 \quad \mathcal{D}: \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

- Déterminer la matrice dans la base canonique de la projection  $p$  sur le plan  $\mathcal{P}$  parallèlement à la droite  $\mathcal{D}$ .
- Faire de même avec la symétrie  $s$  par rapport à  $\mathcal{P}$  parallèlement à  $\mathcal{D}$ .

**Exercice 36** — Soit  $p$  et  $q$  deux projecteurs.

- Montrer que  $p + q$  est un projecteur ssi  $p \circ q + q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .
- En déduire que  $p + q$  est un projecteur ssi  $p \circ q = q \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

**Exercice 37** — Soient  $E$  un espace vectoriel de dimension  $n$ ,  $f$  et  $g$  deux endomorphismes de  $E$  tels que  $f + g = \text{id}_E$  et  $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) \leq n$ .

- Montrer que  $\text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$ .
- Que peut-on en déduire concernant  $g \circ f$ ?
- Montrer que  $f$  et  $g$  sont des projecteurs.

**Exercice 38** — Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. On considère  $r$  projecteurs  $p_1, \dots, p_r$  tels que  $p_1 + \dots + p_r = \text{id}_E$ .

- Montrer, à l'aide de la trace, que  $\dim(E) = \dim(\text{Im}(p_1)) + \dots + \dim(\text{Im}(p_r))$ .
- En déduire que  $E = \text{Im}(p_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_r)$ .

**Exercice 39** — Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. et  $p, q$  deux projecteurs de  $E$  vérifiant  $p \circ q = 0$ . On pose  $r = p + q - q \circ p$ .

- Montrer que  $r$  est un projecteur.
- Montrer que  $\text{Ker } r = \text{Ker } p \cap \text{Ker } q$ .
- Montrer que  $\text{Im } r = \text{Im } p \oplus \text{Im } q$ .

**Exercice 40** — Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -e.v. et  $p, q$  deux projecteurs de  $E$  tels que  $p \circ q = q \circ p$ .

- Montrer que  $p \circ q$  est un projecteur.
- Montrer que  $\text{Im } p \circ q = \text{Im } p \cap \text{Im } q$ .
- Montrer que  $\text{Ker } p \circ q = \text{Ker } p + \text{Ker } q$ .